

Informativa per la vaccinazione contro il Papillomavirus (HPV – Human Papilloma Virus)

INDICAZIONI NEL GIORNO DELLA SOMMINISTRAZIONE A SCUOLA:

- La vaccinazione verrà effettuata presso l'istituto scolastico, da personale sanitario dell'Azienda Sanitaria, in ambienti idonei e nel rispetto delle norme di sicurezza.
- Per aderire alla vaccinazione è necessario che i genitori/tutori firmino il Consenso Informato in tutte le sue parti, corredato di copia di valido documento di identità.
- E' Raccomandato eseguire la vaccinazione a stomaco pieno
- La vaccinazione può essere somministrata anche in presenza di ciclo mestruale nelle ragazze.

Il Papilloma Virus Umano (HPV) rappresenta una delle infezioni a trasmissione sessuale più diffuse a livello mondiale, con un impatto rilevante sulla salute pubblica in quanto associato a diverse forme di cancro, in particolare il cancro della cervice uterina, ma anche a tumori ano-genitali e orofaringei. La prevenzione primaria mediante la vaccinazione HPV rappresenta una delle strategie di sanità pubblica più efficaci per ridurre l'incidenza di queste patologie.

L'infezione da Papillomavirus umano (HPV) non riguarda esclusivamente la popolazione femminile: anche i maschi possono contrarre e trasmettere il virus, contribuendo alla sua diffusione nella popolazione, con un picco di prevalenza nei giovani adulti subito dopo l'inizio dell'attività sessuale.

L'efficacia nel prevenire infezioni e lesioni precancerose e cancerose dovuti ai sierotipi oncogeni di HPV è molto elevata: 90-100% sia nei maschi che nelle femmine. In Italia la vaccinazione è stata introdotta nel 2007 ed estesa anche ai ragazzi dal 2017.

Modalità di somministrazione

- 11–14 anni: 2 dosi a distanza di 6 mesi
- Dai 15 anni in poi: 3 dosi nell'arco di 6 mesi
- Somministrazione intramuscolare nel deltoide (parte alta del braccio)
-

Possibili Effetti post-vaccinazione

La vaccinazione anti-HPV è generalmente ben tollerata. Gli effetti più comuni possono includere:

- arrossamento, gonfiore o dolore nel sito di iniezione
- Più raramente febbre lieve, cefalea o senso di affaticamento

Tali sintomi sono generalmente lievi e di breve durata.

Controindicazioni


- Febbre in atto
- Allergia ad uno dei componenti del vaccino
- Gravidanza (la vaccinazione va posticipata al termine della stessa)

PER COLORO I QUALI VOLESSERO USUFRUIRE DELLA VACCINAZIONE IN UN MOMENTO DIVERSO

Si ricorda che gli ambulatori dell'Asp di Catania effettuano le aperture giornaliere dal lunedì al venerdì negli orari 8.30-13.00 e nei giorni di martedì e giovedì 8.30-13.00 e 15.00 -17.30, alle quali è possibile accedere tramite prenotazione sul sito

<https://vaccini.aspct.it>

inquadrando il seguente qr-code



o chiamando il centralino 095-2540104

Per informazioni: **095-2540210 o 095-2540104 (lun-ven 08:30-12:30 e mar 15:00-17:30)**
*dal mese di febbraio al mese di aprile , alcuni ambulatori saranno aperti anche il sabato

Contatti istituzionali:

stophpv@aspct.it

Referente: Dott.ssa Erika Barbagallo

erika.barbagallo@aspct.it

095 2540183